Gobierno del Peru

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

RIS JAÉN
RED INTEGRADA DE SALUD

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

BOLETIN EPIDEMIOLOGICO

S.E. 31 - 2025

Lic. Enf. ARTIDORO DIAZ DIAZ
Director de la Red Integrada de Salud Jaén

M.Cs. JUANA IRIS TARRILLO CORRALES
Directora de Epidemiología

Equipo de Epidemiología

* M. Cs. Juana Iris Tarrillo Corrales
* Mag. Dwaygh Manuel León Sánchez
* Lic. Enf. Sara Del Milagro López Bazán
* Psc. Karen Graciela Huancas Martínez
* Lic. Merly Del Pilar Linares García

DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

SITUACION EPIDEMIOLOGICA EN DENGUE

Dengue es una enfermedad sistémica y dinámica, el amplio espectro clínico incluye varias formas de manifestaciones clínicas severas y no severas, después de un período de incubación la enfermedad comienza abruptamente y puede ser seguida de las siguientes 3 fases: Fase febril, Fase Crítica y Fase de Recuperación.

El presente reporte tiene como objetivo caracterizar el brote de dengue ocurrido en la **Provincia de Jaén cuenta con una población de riesgo de 165960**.

En la S.E. 31- 2025, se han notificado 71 casos de Dengue en la Prov. Jaén.

El acumulado de casos de Dengue en la Provincia de Jaén, es 5157 con una T.I.A. 310.7.
En el canal endémico nos encontramos en **Zona de Epidemia.**

Canal Endemico De Dengue Prov. Jaen SE. 01 - 31 - 2025



Casos, Incidencia y Clasificación Clínica de Dengue
Red Integrada de Salud Jaén S.E. 01 - 31 - 2025

Distritos	Casos	T.I.A. x 10,000 hab.	Dengue Sin Señales Alarma		Dengue Con Señales Alarma		Dengue Grave		Hospitalizados		N° Fallecidos	Tasa de Letalidad
			Casos	%	Casos	%	Casos	%	N°	%		
Jaén	4776	452.6	4104	86	661	13.8	11	0.2	1284	26.9	3	0.07
Bellavista	197	158.9	162	82	35	17.8	0	0.0	7	3.6	0	0.0
Chontali	2	9.4	2	100	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Colasay	17	31.1	16	94	1	5.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Pucara	50	70.3	46	92	4	8.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
San Jose del Alto	84	142.1	82	98	2	2.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Santa Rosa	31	41.6	31	100	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Prov. Jaén	**5157**	**310.7**	**4443**	**86.15**	**703**	**13.63**	**11**	**0.21**	**1291**	**25.03**	**3**	**0.1**

SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE FEBRILES:

La vigilancia contempla a todo febril de cualquier curso de vida, con o sin foco de infección, que acuden a los establecimientos de salud por atención o detectado por búsqueda activa, con el objetivo de detectar, analizar e investigar el incremento inusual relacionado a un brote no detectado por definición de caso.

En la S.E. 31- 2025, se ha notificado 218 febriles en la Prov. Jaén.

Tendencia Semanal de la Vigilancia de Febriles
Red Integrada de Salud Jaén, hasta S.E. 01 - 31 - 2025



En la Provincia de Jaén, la población con mayor número y porcentaje de febriles es la edad de 20 a 59 años, con un 32.5%.

Casos de Febriles, Porcentaje y TIA por Grupo de Edad
Red Integrada de Salud Jaén - S.E. 01 - 31 - 2025

Grupo de Edad	N° Casos	%	T.I.A x 1000 hab.
Menor de 01 año	1101	6.4	301.1
1 a 4 años	3111	18.2	204.2
5 a 9 años	2870	16.8	153.4
10 a 19 años	3326	19.4	87.7
20 a 59 años	5560	32.5	51.8
Mayo igual a 60 años	1161	6.8	61.1
Total Febriles	**17129**	**100**	**84.8**

SITUACIÓN EPIDEMIOLOGICA DE LEPTOSPIROSIS:

La leptospirosis es una enfermedad zoonótica de distribución mundial, endémica en las regiones tropicales con potencial epidémico. Causada por la bacteria Leptospira interrogans que afecta tanto a humanos como animales, ya sean domésticos o silvestres, lo que significa un grave problema de salud pública. Es probable que los perros, los cerdos y las ratas sean las fuentes más comunes de transmisión a los seres humanos. La vigilancia epidemiológica se encuentra establecida a través de la Directiva Sanitaria N° 065 – MINSA/DGE – V.01, "Directiva Sanitaria para la vigilancia epidemiológica de enfermedades zoonóticas, accidentes por animales ponzoñosos y epizootias", que establece los criterios y definiciones de caso para su notificación e investigación.

En la S.E. 31- 2025, se notificó 01 casos de Leptospirosis en el Distrito de Bellavista de la Prov. Jaén.

Casos de Leptospirosis
Red Integrada de Salud Jaen Años 2021 - 2025 (S.E. 31)



En la Provincia de Jaén, el total de casos confirmados de Leptospirosis es de 148 casos con una T.I.A. 7.33 y 198 casos probables.

Casos y Tasa de Incidencia de Leptospirosis
Red Integrada de Salud Jaén S.E. 01 - 31-2025

Provincia / Distritos	Leptospirosis		
	Notificados en la S.E. 31	Casos Confirmados S.E. 01-31-2025	T.I.A. x 10,000 hab.
Jaen		121	11.51
Bellavista	1	19	12.35
Chontali		1	0.98
Huabal		2	2.21
Pomahuaca		2	2.09
San Jose Alto		3	3.83
Total	**1**	**148**	**7.33**

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LEISHMANIASIS:

La Leishmaniasis es una enfermedad de evolución crónica que se adquiere en zonas rurales y es producida por parásitos del género Leishmaniasis. El cuadro clínico varía de acuerdo al tipo del parásito, al medio ambiente y a la respuesta inmune del huésped.
Es importante conocer el comportamiento de los vectores, su distribución, la forma de trasmisión lo cual permitirá establecer nuevas estrategias de intervención.

En la S.E. 31- 2025, se notificó 02 casos de Leishmaniasis de los Distrito Jaén y Colasay, de la Prov. Jaén.
El acumulado a nivel de la Prov. Jaén es 40 casos con una T.I.A. 1.98.



Numero de Casos y Tasa de Incidencia de Leishmaniasis
Red Integrada de Salud Jaén, S.E. 01 - 31 - 2025

Provincia / Distritos	Leishmaniasis		
	Notificados en la S.E. 31	Acumulado S.E. 01 - 31 - 2025	T.I.A. x 10,000 hab.
Jaen	1	8	0.76
Chontali		12	11.82
Colasay	1	9	8.75
Pomahuaca		1	1.05
Pucara		1	1.39
Sallique		7	9.34
Santa Rosa		2	1.96
Total	**2**	**40**	**1.98**

SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE IRAS:

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) son un conjunto de infecciones que afectan desde oídos, nariz, garganta hasta los pulmones, ocasionados en su mayoría por virus, pero también por bacterias o parásitos; además, constituyen una importante causa de morbimortalidad, fundamentalmente entre los niños menores de 5 años, las personas mayores de 60 años y aquellas que presentan ciertas condiciones que aumentan el riesgo para desarrollar complicaciones que pueden derivar en formas graves; por ejemplo, gestantes, enfermedades inmunosupresoras, entre otras.

En la S.E. 31- 2025, en la Prov. Jaén se notificó 261 IRAS en niños menores de 05 años.

El acumulado de IRAS en menores de 05 años a nivel de la Prov. Jaén es de 8587 una T.I.A. 454.58.
En el canal endémico nos ubicamos es **Zona de Seguridad**.



SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE LAS NEUMONIAS:

En la S.E. 31- 2025, se notificó 08 neumonías en niño en menores de 05 años, de la Prov. Jaén.

En la Prov. Jaén, el acumulado es de 246 casos de Neumonías No Graves y Graves en menores de 5 años, con una T.I.A. 13.02.

Respecto al canal endémico nos ubicamos en **Zona de Epidemia.**



DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Numero de Casos y Tasa de Incidencia de Infecciones Respiratorias Agudas
Red Integrada de Salud Jaén S.E. 01 - 31 - 2025

PROVINCIA / DISTRITOS	IRAS			NEUMONIA			SOB/ASMA		
	S.E. 31	Acum. S.E. 01 - 31 - 2025	T.I.A. x 1,000 hab.	S.E. 31	Acum. S.E. 01 - 31 - 2025	T.I.A. x 1,000 hab.	S.E. 31	Acum. S.E. 01 - 31 - 2025	T.I.A. x 10,000 hab.
Jaen	115	4378	421.08	6	237	22.80	9	483	46.46
Bellavista	13	691	504.01	0	4	2.92	0	2	1.46
Chontali	11	254	286.36	0	1	1.13	0	0	0.00
Colasay	18	476	539.07	2	2	2.27	0	0	0.00
Huabal	23	607	734.87	0	0	0.00	0	0	0.00
Las Pirias	1	90	233.16	0	0	0.00	0	0	0.00
Pomahuaca	13	348	380.74	0	0	0.00	0	1	1.09
Pucara	13	349	582.64	0	0	0.00	0	3	5.01
Sallique	19	433	548.80	0	0	0.00	0	0	0.00
San Felipe	3	99	275.77	0	0	0.00	0	0	0.00
San Jose Alto	13	378	536.93	0	1	1.42	0	0	0.00
Santa Rosa	19	484	624.52	0	1	1.29	0	0	0.00
Total	261	8587	454.58	8	246	13.02	9	489	25.89

SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE DIARREAS ACUOSAS:

Las enfermedades diarreicas agudas, se caracterizan por un aumento en la frecuencia y una disminución en la consistencia de las heces. Pueden ir acompañados de otros síntomas como dolor abdominal, fiebre, náuseas y malestar. Las enfermedades diarreicas agudas afectan a todos los grupos de edad sin excepción, sin embargo, son la 2da mayor causa de mortalidad en el mundo en los niños menores de 5 años, especialmente en las zonas de pobreza o bajos recursos. Existen 3 tipos de enfermedad diarreica, las acuosas que se caracterizan por ser de presentación explosiva, que puede durar algunas horas o días; las disentéricas o disentería que se caracterizan por la presencia de sangre en las heces y las persistentes que pueden durar más de 14 días.
Las diarreas pueden ser provocadas por microorganismos, como virus, bacterias o parásitos, la mayoría de los cuales se trasmiten por agua y/o alimentos con contaminación.

En la S.E. 31- 2025, se notificaron enfermedades diarreicas acuosas por grupos de edad (<1 año hasta 60+), en la Prov. Jaén 316.

En la Provincia de Jaén el acumulado de Diarreas acuosas es de 7089 caso con una T.I.A. 351.01.

En el canal endémico nos encontramos en **Zona de Epidemia.**



SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE LAS DIARREAS DISENTERICAS:

En la S.E. 31- 2025, notificación negativa de diarrea disentérica en los distritos de la Prov. Jaén.

En la Prov. Jaén es de 08 casos, con una T.I.A. 0.40.

El Canal endémico los episodios de las diarreas disentéricas se encuentra en **Zona de Éxito.**



Casos y Tasa de Incidencia de Diarrea Acuosas y Disentéricas
Red Integrada de Salud Jaén S.E. 01 - 31 - 2025

Distritos	D. Acuosas			D. Disénterica		
	S.E. 31	Acum. S.E. 01 -31 - 2025	T.I.A. x 10,000 hab.	S.E. 31	Acum. S.E. 01 -31 - 2025	T.I.A. x 10,000 hab.
Jaen	233	4222	401.61	0	1	0.10
Bellavista	14	550	357.54	0	0	0.00
Chontali	7	163	160.53	0	1	0.98
Colasay	10	302	293.57	0	0	0.00
Huabal	12	416	458.86	0	0	0.00
Las Pirias	2	156	308.61	0	0	0.00
Pomahuaca	3	175	183.19	0	0	0.00
Pucara	3	146	203.65	0	2	2.79
Sallique	11	367	489.86	0	1	1.33
San Felipe	1	94	202.50	0	3	6.46
San Jose Alto	12	287	366.40	0	0	0.00
Santa Rosa	8	211	206.90	0	0	0.00
Provincia Jaén	316	7089	351.01	0	8	0.40

SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES – SARAMPION /RUBEOLA, PARÁLISIS FLÁCIDA, TOS FERINA.

¿Qué es Búsqueda Activa?
Es un procedimiento que trata de identificar en los registros de atención diaria casos sujetos a notificación que por alguna razón o motivo no haya sido captado ni notificado por el sistema de vigilancia epidemiológica.
Tipo de Búsqueda Activa:

Institucional.- Se revisa todas las fuentes de información disponibles sobre producción de actividades médicas de un establecimiento de salud.

Comunitaria.- Esta actividad se realiza en forma obligatoria como parte del proceso de investigación de toda enfermedad prevenible por vacuna en especial de las enfermedades que se encuentran en vías de erradicación, eliminación y control para ello se hace la visita casa por casa por entrevista a una persona mayor de edad.
Reporte oportuno al 100%.
Se recomienda a los Establecimientos de Salud realizar la búsqueda activa y pasiva de los febriles eruptivos, parálisis flácida y notificación inmediata.

DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Parálisis Flácida:

En la S.E. 31– 2025, notificación negativa.

En la Prov. Jaén, se notificó 01 caso probable de Parálisis Flácida, en un niño de 06 años de edad, procedente del Distrito Pucara, Prov. Jaén.

Tos Ferina:

En la S.E. 31– 2025, notificación negativa.

En la Provincia de Jaén, se tiene un acumulado de 18 casos notificados de Tos Ferina (17 confirmados y 01 probable).

Casos probables y confirmados de Tos Ferina, según inicio de sintomas
Red Integrada de Salud Jaén, SE. 01-31-2025



El curso de vida con mayor número de casos es de 0 a 11 años, con un 44.4%.

Casos de Tos Ferina, por curso de vida
Red Integrada de Salud Jaén SE. 01 - 31 - 2025



SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE COVID-19:

El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente el COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo.

En la S.E. 31– 2025, notificación negativa de **COVID-19**, en los distritos de la Prov. Jaén.

En la Provincia de Jaén, tiene un total de 18 casos confirmados con una T.I.A. 0.09.

Casos de COVID-19, según fecha de inicio de síntomas en la
Red Integrada de Salud Jaén, S.E.01 - 31 - 2025



Casos COVID-19, Tasa de Incidencia, Hospitalizados y Fallecidos
Red Integrada de Salud Jaén, S.E. 01-31-2025

Provincia / Distritos	Casos de COVID-19	T.I.A x 1,000 hab.	Hospitalizados	N° Fallecidos
Prov. Jaén	18	0.09	3	1
Jaén	18	0.17	3	1

SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE MUERTE FETAL/NEONATAL:

Las defunciones fetales y neonatales forman parte del perfil de mortalidad del país; disponer de datos confiables de muerte fetal y neonatal e identificar los denominadores más apropiados para la construcción y monitoreo de indicadores como tasa de mortalidad fetal intrauterina, tasa de mortalidad perinatal y tasa de mortalidad neonatal son necesarios para medir el efecto de los programas de salud materna, neonatal y fetal así como para medir la calidad de la atención antes y durante el trabajo de parto y la atención del neonato.

En la S.E. 31- 2025, notificación negativa de muertes fetales y neonatales de la Prov. Jaén.

Muertes Fetales y Neonatales por años
Red Integrada de Salud Jaén 2016 al 2025 (S.E. 01 - 31)



Muertes Fetales y Neonatales por Distrito
Red Integrada de Salud Jaén S.E. 01 - 31 – 2025

Distritos	Muerte Fetal	Muerte Neonatal	Total Defunciones
Jaen	6	4	**10**
Bellavista	0	2	**2**
Chontali	1	0	**1**
Colasay	1	0	**1**
Pomahuaca	0	1	**1**
Sallique	2	0	**2**
Santa Rosa	1	0	**1**
Prov. Jaén	**11**	**7**	**18**

DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

MATRIS BABYS

Es una herramienta de análisis que cruza las variables de edad en el momento de la muerte del feto o neonato (antes/ durante /después del parto), con el peso al nacer, en un marco de prioridades de intervención y evaluación de las mismas.

PESO	MUERTE FETAL		MUERTE NEONATAL	TOTAL
	ANTES DEL PARTO	DURANTE EL PARTO	DESPUES DEL PARTO	
500 - 1499 grs.	4	0	2	6
1500 - 2499 grs.	5	0	4	9
> 2500 gr.	2	0	1	3
TOTAL	11	0	7	18

Problemas derivados de:

Nutrición, infecciones, alta paridad, o embarazo a temprana edad

Pobre cuidado durante el embarazo

Pobre cuidado y asistencia del parto, emergencias obstétricas

Capacidad institucional de atención del RN, educación en cuidado RN

PESO	MUERTE FETAL		MUERTE NEONATAL	TOTAL
	ANTES DEL PARTO	DURANTE EL PARTO	DESPUES DEL PARTO	
500 - 1499 grs.	33.33			6
1500 - 2499 grs.	63.64	0.00	27.78	9
>2500 gr.				3
TOTAL	11	0	7	18

- En el año 2025 (S.E. 01 – 31), el 33.33% de la mortalidad perinatal neonatal corresponde a productos con pesos inferiores a 1500 grs y que están relacionados a problemas en la salud materna (nutrición, infecciones, alta paridad, embarazos a temprana edad, etc.).
- El 27.78% de las notificaciones corresponden a productos con bajo peso y peso normal, lo que estaría relacionado a los procesos de atención del RN, capacidad institucional y educación para el cuidado del RN en el hogar.
- Es de mucha importancia registrar el dato de momento de parto, de manera correcta, así como el peso.

PESO	MUERTE NEONATAL			TOTAL
	<24 Horas	1-7 Días	8-28 Días	
500 - 1499 grs.	0	2	0	2
1500 - 2499 grs.	1	3	0	4
>2500	0	1	0	1
TOTAL	1	6	0	7
PORCENTAJE	14.3	85.7	0.0	100

En el año 2025, hasta la S.E. 31, la mayor proporción de defunciones neonatales se registra en RN con 1 a 7 días de vida (85.7%).

Es necesario colocar correctamente la **Fecha/Hora** de nacimiento y de muerte, caso contrario no se puede determinar el tiempo de sobrevida.

SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE MUERTE MATERNA:

La salud materna es uno de los temas de salud pública de gran importancia y prioritario, siendo considerada un indicador de inequidad de género, inequidad en el acceso a los servicios de salud, pobreza, injusticia y desigualdad social. En la tabla siguiente se muestra las muertes maternas según tipo y procedencia por distrito desde el año 2016 al 2025.

En la S.E. 31- 2025, notificación negativa de M. Materna.

A nivel de la RIS Jaén, se tiene 03 M. Maternas, 01 procedente de la Localidad El Laurel de Chingama, jurisdicción de Ambato Tambora, Distrito Bellavista, 01 Localidad Arenal, Dist. Jaén, Prov. Jaén y 01 M. Materna, procedente de la Localidad de Nvo. Paraiso, Dist. Cajaruro, Prov. Bagua.

Notificación de Muertes Maternas por Distrito, Años y Procedencia
Red Integrada de Salud Jaén 2016 - 2025 (S.E. 01-31)

Distritos	2021		2022		2023		2024			2025	
	M.M. Directa	M.M. Indirecta	M.M. Directa	M.M. Indirecta	M.M. Directa	M.M. Indirecta	M.M. Directa	M.M. Indirecta	M.M. Incidental	M.M. Directa	M.M. Indirecta
Jaén					2			1			1
Bellavista										1	
Colasay											
Pomahuaca											
Pucara			1								
Chontali											
Sallique											
San Felipe	1										
San Jose del Alto											
Santa Rosa											
Prov. Jaén	**3**	**0**	**1**	**0**	**2**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**

SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE VIOLENCIA FAMILIAR:

El termino Violencia familiar alude a todas las formas de abuso que tienen lugar en las relaciones entre los miembros de una familia. Se denomina relación de abuso a aquella forma de interacción que, enmarcada en un contexto de desequilibrio de poder, incluye conductas de una de las partes que, por acción o por omisión, ocasionan daño físico y/o psicológico a otro miembro de la relación.

Hasta la S.E. 31- 2025, podemos observar que los casos de violencia predominan en mujeres de edades entre 30 y 59 años (30.6%), donde el 30.1% cuenta con secundaria completa.

Caracteristicas de los agredidos por violencia familiar.	Nº Casos	%
Sexo		
Femenino	160	87.4
Masculino	23	12.6
Curso de vida		
Niño (0-11)	23	12.6
Adolescente (12-17)	44	24.0
Joven (18-29)	54	29.5
Adulto (30-59)	56	30.6
Adulto mayor (60 a más)	6	3.3
Grado de instrucción		
Secundaria completa	55	30.1
Secundaria incompleta	43	23.5
Primaria incompleta	30	16.4
Primaria completa	23	12.6
Superior completa	17	9.3
Superior incompleta	9	4.9
Iletrada	6	3.3

El tipo de violencia ejercido en ellas en su mayoría es la violencia psicológica y física, no existiendo motivo para sufrir este maltrato.

Caracteristicas de la agresion	Nº Casos	%
Tipo de violencia		
Psicológica	144	66.4
Física	68	31.3
Sexual	48	22.1
Abandono	6	2.8
Motivo expresado		
Sin motivos	55	39.3
Celos	45	32.1
Otros	19	13.6
Economicos	19	13.6
Laborales	2	1.4

SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE ACCIDENTES TRANSITO:

Los Distritos donde se tiene la mayor ocurrencia de lesionados por accidentes de tránsito es el Distrito de Jaén con 83.4% (297), seguido de Bellavista con 7.3% (26).

Accidentes de Tránsito, por Distrito de ocurrencia
Red Integrada de Salud Jaén, S.E. 01 – 31 – 2025



Existen un numero de 46 lesionados que corresponden a varones y 90 lesionados que corresponden al sexo femenino ubicando el mayor porcentaje en el curso de vida adulto entre 30 y 59 años.

Accidentes de Tránsito, por curso de vida
Red Integrada de Salud Jaén, S.E. 01 – 31 - 2025



SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE ITS – VIH SIDA:

Desde el inicio de la epidemia de VIH en nuestro país, han transcurrido casi 3 décadas en las cuales se ha logrado avanzar en términos de prevención y atención de la población más afectada y vulnerable, sin embargo, esta continúa siendo un importante problema de salud pública, con una epidemiología compleja que plantea retos para un mayor conocimiento de su dinámica y para el diseño de intervenciones que permitan disminuir las brechas aún existentes en prevención y control de esta infección.

Así mismo, las infecciones de transmisión sexual (ITS) constituyen un importante cofactor que incrementa la probabilidad de transmisión del VIH, y cuyo abordaje en las políticas de salud es relevante

SIFILIS:

En la Provincia de Jaén, en la S.E. 31, no se han notificado casos de sífilis y gonorrea y en lo que va el año 2025, en el sistema de vigilancia epidemiológica ITS y VIH-SIDA se encuentran notificados un total de 19 casos de sífilis, los mismos que se encuentra siendo monitoreados por los establecimientos de salud notificantes.

Casos confirmados de Sífilis, por semanas epidemiológicas
Red Integrada de Salud Jaén SE. 01-31-2025



VIH – SIDA:

En la provincia de Jaén, en la S.E. 31, notificación negativa de VIH.

En lo que va el año 2025, en el sistema de vigilancia epidemiológica de VIH– SIDA, han notificado un total de 32 casos confirmados, de los cuales 01 caso es diagnosticado como estadio SIDA.

Casos de VIH-SIDA, según semanas epidemiológicas
Red Integrada de Salud Jaén SE. 01-31-2025



DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

MAPA EPIDEMIOLOGICO DE LAS ENFERMEDADES ACUMULADAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
RED INTEGRADA DE SALUD JAEN S.E. 31 – 2025



S. JOSE ALTO
Dengue Sin S. Alarma: 82 casos
Dengue Con S. Alarma: 02 casos
Leptospirosis: 03 casos
Enf. Carrión: 01 caso

CHONTALI
Dengue Sin S. Alarma: 02 casos
Leishmaniasis: 12 casos
Leptospirosis: 01 caso

SALLIQUE
Leishmaniasis: 07 casos
Ofidismo: 01 caso
Tos Ferina: 01 caso
M. Fetal: 01 defunción

SAN FELIPE

POMAHUACA
Leptospirosis: 02 casos
Tos Ferina: 01 casos
Leishmaniasis: 01 caso
Sífilis: 01 caso
Ofidismo: 01 caso

PUCARA
Dengue Sin S. Alarma: 46 casos
Dengue Con S. Alarma: 04 casos
Leishmaniasis: 01 caso
Parálisis Flácida: 01 caso

BELLAVISTA
Dengue Sin S. Alarma: 162 casos
Dengue con S/Alarma: 35 casos
Tos Ferina: 01 caso
Hepatitis: 01 caso
Sífilis: 02 casos
Leptospirosis: 31 casos
M. Materna: 01 defunción
M. Neonatal: 01 defunción

SANTA ROSA
Dengue Sin S. Alarma: 31 casos
Leishmaniasis: 02 casos
Hepatitis: 02 casos
Varicela S/Compl.: 01 caso
M. Fetal: 01 defunción

HUABAL
Leptospirosis: 03 casos

LAS PIRIAS
Sífilis: 01 caso

JAEN
Dengue Sin S. Alarma: 4104 casos
Dengue con S/Alarma: 661 casos
Dengue Grave: 11 casos
Oropuche: 02 casos
Hepatitis: 05 casos
Leptospirosis: 305 casos
Intox. Plaguicidas: 01 caso
Sífilis: 15 casos
Tos Ferina: 14 casos
Leishmaniasis: 08 casos
Influenza: 01 caso
Covid-19: 18 casos
Loxocelismo: 01 caso
M. Materna: 01 defunción
M. Fetal: 06 defunciones
M. Neonatal: 04 defunciones

COLASAY
Dengue Sin S. Alarma: 16 casos
Dengue Con S. Alarma: 01 casos
Leptospirosis: 01 caso
Leishmaniasis: 09 casos