Gobierno del Peru

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

RIS JAÉN
RED INTEGRADA DE SALUD

DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

BOLETIN EPIDEMIOLOGICO

S.E. 33 - 2025

Lic. Enf. ARTIDORO DIAZ DIAZ
Director de la Red Integrada de Salud Jaén

M.Cs. JUANA IRIS TARRILLO CORRALES
Directora de Epidemiología

Equipo de Epidemiología

* M. Cs. Juana Iris Tarrillo Corrales
* Mag. Dwaygh Manuel León Sánchez
* Lic. Enf. Sara Del Milagro López Bazán
* Psc. Karen Graciela Huancas Martínez
* Lic. Merly Del Pilar Linares García

DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

SITUACION EPIDEMIOLOGICA EN DENGUE

Dengue es una enfermedad sistémica y dinámica, el amplio espectro clínico incluye varias formas de manifestaciones clínicas severas y no severas, después de un período de incubación la enfermedad comienza abruptamente y puede ser seguida de las siguientes 3 fases: Fase febril, Fase Crítica y Fase de Recuperación.

El presente reporte tiene como objetivo caracterizar el brote de dengue ocurrido en la **Provincia de Jaén cuenta con una población de riesgo de 165960**.

En la S.E. 33 - 2025, se han notificado 53 casos de Dengue en la Prov. Jaén.

El acumulado de casos de Dengue en la Provincia de Jaén, es 5208 con una T.I.A. 313.8.
En el canal endémico nos encontramos en **Zona de Epidemia.**

Canal Endemico De Dengue Prov. Jaen SE. 01 - 33 - 2025



Fuente: Sistema NOTISP

Casos, Incidencia y Clasificación Clínica de Dengue
Red Integrada de Salud Jaén S.E. 01 - 33 - 2025

Distritos	Casos	T.I.A. x 10,000 hab.	Dengue Sin Señales Alarma		Dengue Con Señales Alarma		Dengue Grave		Hospitalizados		N° Fallecidos	Tasa de Letalidad
			Casos	%	Casos	%	Casos	%	N°	%		
Jaén	4816	456.3	4106	85	699	14.5	11	0.2	1358	28.2	3	0.07
Bellavista	197	158.9	160	81	37	18.8	0	0.0	7	3.6	0	0.0
Chontali	2	9.4	2	100	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Colasay	18	32.9	17	94	1	5.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Pucara	53	74.5	49	92	4	7.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
San Jose del Alto	90	152.3	88	98	2	2.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Santa Rosa	32	42.9	31	97	1	3.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Prov. Jaén	**5208**	**313.8**	**4453**	**85.50**	**744**	**14.29**	**11**	**0.21**	**1365**	**26.21**	**3**	**0.1**

Fuente: Sistema NOTISP

SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE FEBRILES:

La vigilancia contempla a todo febril de cualquier curso de vida, con o sin foco de infección, que acuden a los establecimientos de salud por atención o detectado por búsqueda activa, con el objetivo de detectar, analizar e investigar el incremento inusual relacionado a un brote no detectado por definición de caso.

En la S.E. 33 - 2025, se ha notificado 310 febriles en la Prov. Jaén.

Tendencia Semanal de la Vigilancia de Febriles
Red Integrada de Salud Jaén, hasta S.E. 01 - 33 - 2025



Fuente: Aplicativo Vig. Febriles-NOTISP

En la Provincia de Jaén, la población con mayor número y porcentaje de febriles es la edad de 20 a 59 años, con un 32.4%.

Casos de Febriles, Porcentaje y TIA por Grupo de Edad
Red Integrada de Salud Jaén - S.E. 01 - 33 - 2025

Grupo de Edad	N° Casos	%	T.I.A x 1000 hab.
Menor de 01 año	1203	6.6	329.0
1 a 4 años	3374	18.4	221.5
5 a 9 años	3076	16.8	164.4
10 a 19 años	3489	19.0	92.0
20 a 59 años	5949	32.4	55.4
Mayo igual a 60 años	1250	6.8	65.8
Total Febriles	**18341**	**100**	**90.8**

Fuente: Aplicativo Vig. Febriles-NOTISP

SITUACIÓN EPIDEMIOLOGICA DE LEPTOSPIROSIS:

La leptospirosis es una enfermedad zoonótica de distribución mundial, endémica en las regiones tropicales con potencial epidémico. Causada por la bacteria Leptospira interrogans que afecta tanto a humanos como animales, ya sean domésticos o silvestres, lo que significa un grave problema de salud pública. Es probable que los perros, los cerdos y las ratas sean las fuentes más comunes de transmisión a los seres humanos. La vigilancia epidemiológica se encuentra establecida a través de la Directiva Sanitaria N° 065 – MINSA/DGE – V.01, "Directiva Sanitaria para la vigilancia epidemiológica de enfermedades zoonóticas, accidentes por animales ponzoñosos y epizootias", que establece los criterios y definiciones de caso para su notificación e investigación.

En la S.E. 33 - 2025, se notificó 01 caso probables de Leptospirosis en el Dist. Jaén, Prov. Jaén.

Casos de Leptospirosis
Red Integrada de Salud Jaen Años 2021 - 2025 (S.E. 33)



Fuente: Sistema NOTISP

En la Provincia de Jaén, el total de casos confirmados de Leptospirosis es de 148 casos con una T.I.A. 7.33 y 203 casos probables.

Casos y Tasa de Incidencia de Leptospirosis
Red Integrada de Salud Jaén S.E. 01 - 33-2025

Provincia / Distritos	Leptospirosis		
	Notificados en la S.E. 33	Casos Confirmados S.E. 01-33-2025	T.I.A. x 10,000 hab.
Jaen	1	121	11.51
Bellavista		19	12.35
Chontali		1	0.98
Huabal		2	2.21
Pomahuaca		2	2.09
Pucara			0.00
San Jose Alto		3	3.83
Total	**1**	**148**	**7.33**

Fuente: Sistema NOTISP

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LEISHMANIASIS:

La Leishmaniasis es una enfermedad de evolución crónica que se adquiere en zonas rurales y es producida por parásitos del género Leishmaniasis. El cuadro clínico varía de acuerdo al tipo del parásito, al medio ambiente y a la respuesta inmune del huésped.
Es importante conocer el comportamiento de los vectores, su distribución, la forma de trasmisión lo cual permitirá establecer nuevas estrategias de intervención.

En la S.E. 33 - 2025, se notificó 01 caso de Leishmaniasis de los Distrito Jaén de la Prov. Jaén.
El acumulado a nivel de la Prov. Jaén es 41 casos con una T.I.A. 2.03



Fuente: Sistema NOTISP

Numero de Casos y Tasa de Incidencia de Leishmaniasis
Red Integrada de Salud Jaén, S.E. 01 - 33 - 2025

Provincia / Distritos	Leishmaniasis		
	Notificados en la S.E. 33	Acumulado S.E. 01 - 33 - 2025	T.I.A. x 10,000 hab.
Jaen	1	9	0.86
Chontali		12	11.82
Colasay		9	8.75
Pomahuaca		1	1.05
Pucara		1	1.39
Sallique		7	9.34
Santa Rosa		2	1.96
Total	**1**	**41**	**2.03**

Fuente: Sistema NOTISP

SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE IRAS:

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) son un conjunto de infecciones que afectan desde oídos, nariz, garganta hasta los pulmones, ocasionados en su mayoría por virus, pero también por bacterias o parásitos; además, constituyen una importante causa de morbimortalidad, fundamentalmente entre los niños menores de 5 años, las personas mayores de 60 años y aquellas que presentan ciertas condiciones que aumentan el riesgo para desarrollar complicaciones que pueden derivar en formas graves; por ejemplo, gestantes, enfermedades inmunosupresoras, entre otras.

En la S.E. 33 - 2025, en la Prov. Jaén se notificó 267 IRAS en niños menores de 05 años.

El acumulado de IRAS en menores de 05 años a nivel de la Prov. Jaén es de 9104 una T.I.A. 481.95.
En el canal endémico nos ubicamos es **Zona de Seguridad**.



Fuente: Sistema NOTISP

SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE LAS NEUMONIAS:

En la S.E. 33 - 2025, se notificó 10 neumonías en niño en menores de 05 años, de la Prov. Jaén.

En la Prov. Jaén, el acumulado es de 261 casos de Neumonías No Graves y Graves en menores de 5 años, con una T.I.A. 13.82.

Respecto al canal endémico nos ubicamos en **Zona de Epidemia.**



Fuente: Sistema NOTISP

DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Numero de Casos y Tasa de Incidencia de Infecciones Respiratorias Agudas
Red Integrada de Salud Jaén S.E. 01 - 33 - 2025

DISTRITOS	IRAS			NEUMONIA			SOB/ASMA		
	S.E. 33	Acum. S.E. 01 - 33 - 2025	T.I.A. x 1,000 hab.	S.E. 33	Acum. S.E. 01 - 33 - 2025	T.I.A. x 1,000 hab.	S.E. 33	Acum. S.E. 01 - 33 - 2025	T.I.A. x 10,000 hab.
Jaen	122	4617	444.07	10	252	24.24	8	504	48.48
Bellavista	21	728	531.00	0	4	2.92	0	2	1.46
Chontali	8	276	311.16	0	1	1.13	0	0	0.00
Colasay	14	507	574.18	0	2	2.27	0	0	0.00
Huabal	20	642	777.24	0	0	0.00	0	0	0.00
Las Pirias	3	95	246.11	0	0	0.00	0	0	0.00
Pomahuaca	15	375	410.28	0	0	0.00	0	1	1.09
Pucara	13	375	626.04	0	0	0.00	0	3	5.01
Sallique	20	470	595.69	0	0	0.00	0	0	0.00
San Felipe	2	104	289.69	0	0	0.00	0	0	0.00
San Jose Alto	10	398	565.34	0	1	1.42	0	0	0.00
Santa Rosa	19	517	667.10	0	1	1.29	0	0	0.00
Prov. Jaén	**267**	**9104**	**481.95**	**10**	**261**	**13.82**	**8**	**510**	**27.00**

SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE DIARREAS ACUOSAS:

Las enfermedades diarreicas agudas, se caracterizan por un aumento en la frecuencia y una disminución en la consistencia de las heces. Pueden ir acompañados de otros síntomas como dolor abdominal, fiebre, náuseas y malestar. Las enfermedades diarreicas agudas afectan a todos los grupos de edad sin excepción, sin embargo, son la 2da mayor causa de mortalidad en el mundo en los niños menores de 5 años, especialmente en las zonas de pobreza o bajos recursos. Existen 3 tipos de enfermedad diarreica, las acuosas que se caracterizan por ser de presentación explosiva, que puede durar algunas horas o días; las disentéricas o disentería que se caracterizan por la presencia de sangre en las heces y las persistentes que pueden durar más de 14 días.

Las diarreas pueden ser provocadas por microorganismos, como virus, bacterias o parásitos, la mayoría de los cuales se trasmiten por agua y/o alimentos con contaminación.

En la S.E. 33 - 2025, se notificaron enfermedades diarreicas acuosas por grupos de edad (<1 año hasta 60+), en la Prov. Jaén 335.

En la Provincia de Jaén el acumulado de Diarreas acuosas es de 7765 caso con una T.I.A. 384.49.

En el canal endémico nos encontramos en **Zona de Epidemia.**



SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE LAS DIARREAS DISENTERICAS:

En la S.E. 33 - 2025, notificación negativa de diarrea disentérica en los distritos de la Prov. Jaén.

En la Prov. Jaén es de 08 casos, con una T.I.A. 0.40.

El Canal endémico los episodios de las diarreas disentéricas se encuentra en **Zona de Éxito.**



Casos y Tasa de Incidencia de Diarrea Acuosas y Disentéricas
Red Integrada de Salud Jaén S.E. 01 - 33 - 2025

Provincia/ Distritos	D. Acuosa			D. Disenterica		
	S.E. 33	Acum. S.E. 01 -33 - 2025	T.I.A. x 10,000 hab.	S.E. 33	Acum. S.E. 01 -33 - 2025	T.I.A. x 10,000 hab.
Jaén	199	4667	443.94	0	1	0.10
Bellavista	26	595	386.79	0	0	0.00
Chontali	6	173	170.38	0	1	0.98
Colasay	12	323	313.99	0	0	0.00
Huabal	18	445	490.84	0	0	0.00
Las Pirias	13	170	336.30	0	0	0.00
Pomahuaca	5	184	192.61	0	0	0.00
Pucara	2	159	221.79	0	2	2.79
Sallique	19	397	529.90	0	1	1.33
San Felipe	4	104	224.04	0	3	6.46
San Jose Alto	16	315	402.14	0	0	0.00
Santa Rosa	15	233	228.48	0	0	0.00
Provincia Jaén	**335**	**7765**	**384.49**	**0**	**8**	**0.40**

Fuente: Sistema NOTISP

SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES – SARAMPION /RUBEOLA, PARÁLISIS FLÁCIDA, TOS FERINA.

¿Qué es Búsqueda Activa?

Es un procedimiento que trata de identificar en los registros de atención diaria casos sujetos a notificación que por alguna razón o motivo no haya sido captado ni notificado por el sistema de vigilancia epidemiológica.

Tipo de Búsqueda Activa:

Institucional.- Se revisa todas las fuentes de información disponibles sobre producción de actividades médicas de un establecimiento de salud.

Comunitaria.- Esta actividad se realiza en forma obligatoria como parte del proceso de investigación de toda enfermedad prevenible por vacuna en especial de las enfermedades que se encuentran en vías de erradicación, eliminación y control para ello se hace la visita casa por casa por entrevista a una persona mayor de edad.

Reporte oportuno al 100%.

Se recomienda a los Establecimientos de Salud realizar la búsqueda activa y pasiva de los febriles eruptivos, parálisis flácida y notificación inmediata.

DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Parálisis Flácida:

En la S.E. 33 – 2025, notificación negativa.

En la Prov. Jaén, se notificó 01 caso probable de Parálisis Flácida, en un niño de 06 años de edad, procedente del Distrito Pucara, Prov. Jaén.

Tos Ferina:

En la S.E. 33 – 2025, se notificó 03 casos probables de Tos Ferina del Dist. Huabal, Prov. Jaén.

En la Provincia de Jaén, se tiene un acumulado de 20 casos notificados de Tos Ferina (17 confirmados y 03 probables).



El curso de vida con mayor número de casos es de 0 a 11 años, con un 40%.



SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE COVID-19:

El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente el COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo.

En la S.E. 33 – 2025, notificación negativa de **COVID-19**, en los distritos de la Prov. Jaén.

En la Provincia de Jaén, tiene un total de 18 casos confirmados con una T.I.A. 0.09.



Casos COVID-19, Tasa de Incidencia, Hospitalizados y Fallecidos
Red Integrada de Salud Jaén, S.E. 01-33-2025

Provincia / Distritos	Casos de COVID-19	T.I.A x 1,000 hab.	Hospitalizados	N° Fallecidos
Prov. Jaén	18	0.09	3	1
Jaén	18	0.17	3	1

Fuente: Aplicativo COVID-NOTISP

SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE MUERTE FETAL/NEONATAL:

Las defunciones fetales y neonatales forman parte del perfil de mortalidad del país; disponer de datos confiables de muerte fetal y neonatal e identificar los denominadores más apropiados para la construcción y monitoreo de indicadores como tasa de mortalidad fetal intrauterina, tasa de mortalidad perinatal y tasa de mortalidad neonatal son necesarios para medir el efecto de los programas de salud materna, neonatal y fetal así como para medir la calidad de la atención antes y durante el trabajo de parto y la atención del neonato.

En la S.E. 33 - 2025, se notificó 01 muerte neonatal del Dist. Colasay, Prov. Jaén.



Muertes Fetales y Neonatales por Distrito
Red Integrada de Salud Jaén S.E. 01 - 33 – 2025

Distritos	Muerte Fetal	Muerte Neonatal	Total Defunciones
Jaen	7	5	**12**
Bellavista	0	2	**2**
Chontali	1	0	**1**
Colasay	1	2	**3**
Pomahuaca	0	1	**1**
Sallique	2	0	**2**
Santa Rosa	1	0	**1**
Prov. Jaén	**12**	**10**	**22**

Fuente: Aplicativo MNP-NOTISP

DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

MATRIS BABYS:

Es una herramienta de análisis que cruza las variables de edad en el momento de la muerte del feto o neonato (antes/ durante /después del parto), con el peso al nacer, en un marco de prioridades de intervención y evaluación de las mismas.

PESO	MUERTE FETAL		MUERTE NEONATAL	TOTAL
	ANTES DEL PARTO	DURANTE EL PARTO	DESPUES DEL PARTO	
500 - 1499 grs.	4	0	2	6
1500 - 2499 grs.	5	0	4	9
> 2500 gr.	3	0	4	7
TOTAL	12	0	10	22

Problemas derivados de:

- *Nutrición, infecciones, alta paridad, o embarazo a temprana edad*
- *Pobre cuidado durante el embarazo*
- *Pobre cuidado y asistencia del parto, emergencias obstétricas*
- *Capacidad institucional de atención del RN, educación en cuidado RN*

PESO	MUERTE FETAL		MUERTE NEONATAL	TOTAL
	ANTES DEL PARTO	DURANTE EL PARTO	DESPUES DEL PARTO	
500 - 1499 grs.	27.27			6
1500 - 2499 grs.	72.73	0.00	36.36	9
>2500 gr.				7
TOTAL	12	0	10	22

- **En el año 2025 (S.E. 01 – 33)**, el 27.27% de la mortalidad perinatal neonatal corresponde a productos con pesos inferiores a 1500 grs. y que están relacionados a problemas en la salud materna (nutrición, infecciones, alta paridad, embarazos a temprana edad, etc.).
- El 36.36% de las notificaciones corresponden a productos con bajo peso y peso normal, lo que estaría relacionado a los procesos de atención del RN, capacidad institucional y educación para el cuidado del RN en el hogar.
- Es de mucha importancia registrar el dato de momento de parto, de manera correcta, así como el peso**.**

PESO	MUERTE NEONATAL			TOTAL
	<24 Horas	1-7 Dias	8-28 Dias	
500 - 1499 grs.	0	2	0	2
1500 - 2499 grs.	1	3	0	4
>2500	0	2	2	4
TOTAL	1	7	2	10
PORCENTAJE	10.0	70.0	20.0	100

Hasta la S.E. 33-2025, la mayor proporción de defunciones neonatales se registra en RN con 1 a 7 días de vida (70.0%).

De los RN que fallecieron a partir del día 8, el 20.0% registró peso normal o superior a 2500 grs.

Es necesario colocar correctamente la Fecha/Hora de nacimiento y de muerte, caso contrario no se puede determinar el tiempo de sobrevida.

SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE MUERTE MATERNA:

La salud materna es uno de los temas de salud pública de gran importancia y prioritario, siendo considerada un indicador de inequidad de género, inequidad en el acceso a los servicios de salud, pobreza, injusticia y desigualdad social. En la tabla siguiente se muestra las muertes maternas según tipo y procedencia por distrito desde el año 2016 al 2025.

En la S.E. 33 - 2025, notificación negativa de M. Materna.

A nivel de la RIS Jaén, se tiene 03 M. Maternas, 01 procedente de la Localidad El Laurel de Chingama, jurisdicción de Ambato Tambora, Distrito Bellavista, 01 Localidad Arenal, Dist. Jaén, Prov. Jaén y 01 M. Materna, procedente de la Localidad de Nvo. Paraiso, Dist. Cajaruro, Prov. Bagua.

Notificación de Muertes Maternas por Distrito, Años y Procedencia
Red Integrada de Salud Jaén 2016 - 2025 (S.E. 01-33)

Distritos	2021		2022		2023		2024			2025	
	M.M. Directa	M.M. Indirecta	M.M. Directa	M.M. Indirecta	M.M. Directa	M.M. Indirecta	M.M. Directa	M.M. Indirecta	M.M. Incidental	M.M. Directa	M.M. Indirecta
Jaén					2			1			1
Bellavista										1	
Colasay											
Pomahuaca											
Pucara			1								
Chontali											
Sallique											
San Felipe	1										
San Jose del Alto											
Santa Rosa											
Prov. Jaén	**3**	**0**	**1**	**0**	**2**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**1**

SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE VIOLENCIA FAMILIAR:

El termino Violencia familiar alude a todas las formas de abuso que tienen lugar en las relaciones entre los miembros de una familia. Se denomina relación de abuso a aquella forma de interacción que, enmarcada en un contexto de desequilibrio de poder, incluye conductas de una de las partes que, por acción o por omisión, ocasionan daño físico y/o psicológico a otro miembro de la relación.

Hasta la S.E. 33 - 2025, En la provincia de Jaén, podemos observar casos de violencia predomina en mujeres de edad entre 30 y 59 años (31.7%), donde el 38.8% cuenta con secundaria completa.

Características de los agredidos por violencia familiar
Red Integrada de Salud Jaén, S.E. 01-33-2025

Caracteristicas	Casos	%
Sexo		
Masculino	182	94.8
Femenino	16	8.3
Curso de vida		
Niño (0-11)	3	1.9
Adolescente (12-17)	6	3.8
Joven (18-29)	38	24.2
Adulto (30-59)	102	65.0
Adulto mayor (60 a más)	12	7.6
Estado civil		
Conviviente	67	33.2
Otro	50	24.8
Ex-conviviente	38	18.8
Padre	27	13.4
Madre	9	4.5
Hijo(a)	4	2.0
Ex-conyugue	3	1.5
Esposo(a)	4	2.0
Grado de instrucción		
Secundaria completa	69	38.8
Superior completa	32	18.0
Primaria incompleta	28	15.7
Secundaria incompleta	19	10.7
Primaria completa	17	9.6
Superior incompleta	11	6.2
Iletrada	2	1.1

El tipo de violencia ejercido en ellas en su mayoría es la violencia psicológica (55.6%) y física (23.4%), no exisitiendo motivo para sufrir este maltrato.

Características de la agresión por violencia familiar
Red Integrada de Salud Jaén, S.E. 01-33-2025

Caracteristicas	Nº Casos	%
Estado del agresor		
Ecuanime	165	82.9
Alcohol	27	13.6
Droga	3	1.5
Otros	4	2.0
Tipo de violencia		
Psicológica	159	55.6
Física	67	23.4
Sexual	54	18.9
Abandono	6	2.1

Fuente: Sistema Violencia Familiar – NOTISP

SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE ACCIDENTES TRANSITO:

Los Distritos donde se tiene la mayor ocurrencia de lesionados por accidentes de tránsito es el Distrito de Jaén con 82.15% (313), seguido de Bellavista con 7.3 % (28).

Accidentes de Tránsito, por Distrito de ocurrencia
Red Integrada de Salud Jaén, S.E. 01 – 33 – 2025



Fuente: Sistema Accidentes Transito – NOTISP

Existen un numero de 381 lesionados por accidentes de tránsito, el 31.5% de lesionados corresponden al sexo femenino y 66% sexo masculino.

Accidentes de Tránsito, por curso de vida
Red Integrada de Salud Jaén, S.E. 01 – 33 – 2025



Fuente: Sistema Accidentes Transito – NOTISP

SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE ITS – VIH SIDA:

Desde el inicio de la epidemia de VIH en nuestro país, han transcurrido casi 3 décadas en las cuales se ha logrado avanzar en términos de prevención y atención de la población más afectada y vulnerable, sin embargo, esta continúa siendo un importante problema de salud pública, con una epidemiología compleja que plantea retos para un mayor conocimiento de su dinámica y para el diseño de intervenciones que permitan disminuir las brechas aún existentes en prevención y control de esta infección.

Así mismo, las infecciones de transmisión sexual (ITS) constituyen un importante cofactor que incrementa la probabilidad de transmisión del VIH, y cuyo abordaje en las políticas de salud es relevante.

SIFILIS:

En la Provincia de Jaén, en la S.E. 33, no se han notificado casos de sífilis y gonorrea y en lo que va el año 2025, en el sistema de vigilancia epidemiológica ITS y VIH-SIDA se encuentran notificados un total de 19 casos de sífilis, los mismos que se encuentra siendo monitoreados por los establecimientos de salud notificantes.

Casos confirmados de Sífilis, por semanas epidemiológicas
Red Integrada de Salud Jaén SE. 01-33-2025



Fuente: Aplicativo VIH-SIDA/ITS

VIH – SIDA:

En la provincia de Jaén, en la S.E. 33, notificación negativa de VIH.

En lo que va el año 2025, en el sistema de vigilancia epidemiológica de VIH– SIDA, han notificado un total de 40 casos confirmados, de los cuales 01 caso es diagnosticado como estadio SIDA.

Casos de VIH-SIDA, según semanas epidemiológicas
Red Integrada de Salud Jaén SE. 01-33-2025



Fuente: Aplicativo VIH-SIDA/ITS

DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

MAPA EPIDEMIOLOGICO DE LAS ENFERMEDADES ACUMULADAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
RED INTEGRADA DE SALUD JAEN S.E. 33 – 2025

S. JOSE ALTO
Dengue Sin S. Alarma: 88 casos
Dengue Con S. Alarma: 02 casos
Leptospirosis: 03 casos
Enf. Carrión: 01 caso
Intox. Plaguicidas: 03 casos

CHONTALI
Dengue Sin S. Alarma: 02 casos
Leishmaniasis: 12 casos
Leptospirosis: 01 caso

SALLIQUE
Leishmaniasis: 07 casos
Ofidismo: 01 caso
Tos Ferina: 01 caso
M. Fetal: 01 defunción

SAN FELIPE

POMAHUACA
Leptospirosis: 02 casos
Tos Ferina: 01 casos
Leishmaniasis: 01 caso
Sífilis: 01 caso
Ofidismo: 01 caso

PUCARA
Dengue Sin S. Alarma: 49 casos
Dengue Con S. Alarma: 04 casos
Leishmaniasis: 01 caso
Parálisis Flácida: 01 caso
Intox. Plaguicidas: 01 caso



BELLAVISTA
Dengue Sin S. Alarma: 160 casos
Dengue con S/Alarma: 37 casos
Tos Ferina: 01 caso
Hepatitis: 01 caso
Sífilis: 02 casos
Leptospirosis: 33 casos
Intox. Plaguicidas: 04 casos
M. Materna: 01 defunción
M. Neonatal: 01 defunción

SANTA ROSA
Dengue Sin S. Alarma: 31 casos
Leishmaniasis: 02 casos
Hepatitis: 02 casos
Varicela S/Compl.: 01 caso
Sífilis: 01 caso
M. Fetal: 01 defunción

HUABAL
Leptospirosis: 03 casos
Tos Ferina: 03 caso
Intox. Plaguicidas: 01 caso

LAS PIRIAS
Sífilis: 01 caso

JAEN
Dengue Sin S. Alarma: 4106 casos
Dengue con S/Alarma: 699 casos
Dengue Grave: 11 casos
Oropuche: 02 casos
Hepatitis: 05 casos
Leptospirosis: 307 casos
Intox. Plaguicidas: 01 caso
Sífilis: 15 casos
Tos Ferina: 15 casos
Leishmaniasis: 09 casos
Influenza: 01 caso
Covid-19: 18 casos
Loxocelismo: 01 caso
M. Materna: 01 defunción
M. Fetal: 07 defunciones
M. Neonatal: 05 defunciones

COLASAY
Dengue Sin S. Alarma: 17 casos
Dengue Con S. Alarma: 01 casos
Leptospirosis: 01 caso
Leishmaniasis: 09 casos
Intox. Plaguicidas: 01 caso
M. Fetal: 01 defunción
M. Neonatal: 02 defunciones