Gobierno del Peru

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

RIS JAÉN
RED INTEGRADA DE SALUD

## DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

# BOLETIN EPIDEMIOLOGICO

# S.E. 36 - 2025


**Lic. Enf. ARTIDORO DIAZ DIAZ**
**Director de la Red Integrada de Salud Jaén**

**M.CS. JUANA IRIS TARRILLO CORRALES**
**Directora de Epidemiología**



**Equipo de Epidemiología**

* M. Cs. Juana Iris Tarrillo Corrales
* Mag. Dwaygh Manuel León Sánchez
* Lic. Enf. Sara Del Milagro López Bazán
* Psc. Karen Graciela Huancas Martínez
* Lic. Merly Del Pilar Linares García

**DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA**
**"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"**

## SITUACION EPIDEMIOLOGICA EN DENGUE

Dengue es una enfermedad sistémica y dinámica, el amplio espectro clínico incluye varias formas de manifestaciones clínicas severas y no severas, después de un período de incubación la enfermedad comienza abruptamente y puede ser seguida de las siguientes 3 fases: Fase febril, Fase Crítica y Fase de Recuperación.

El presente reporte tiene como objetivo caracterizar el brote de dengue ocurrido en la **Provincia de Jaén cuenta con una población de riesgo de 165960**.

**En la S.E. 36 - 2025**, se han notificado 43 casos de Dengue en la Prov. Jaén.

El acumulado de casos de Dengue en la Provincia de Jaén, es 5216 con una T.I.A. 314.3.
En el canal endémico nos encontramos en **Zona de Epidemia.**

**Canal Endemico De Dengue Prov. Jaen SE. 01 - 36 - 2025**




Fuente: Sistema NOTISP

**Casos, Incidencia y Clasificación Clínica de Dengue**
**Red Integrada de Salud Jaén S.E. 01 - 36 - 2025**

| Distritos | Casos | T.I.A. x 10,000 hab. | Dengue Sin Signos Alarma | | Dengue Con Signos Alarma | | Dengue Grave | | Hospitalizados | | N° Fallecidos | Tasa de Letalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Casos | % | Casos | % | Casos | % | N° | % | | |
| Jaén | 4827 | 457.4 | 4091 | 85 | 725 | 15.0 | 11 | 0.2 | 1407 | 29.1 | 3 | 0.07 |
| Bellavista | 194 | 156.5 | 157 | 81 | 37 | 19.1 | 0 | 0.0 | 7 | 3.6 | 0 | 0.0 |
| Chontali | 2 | 9.4 | 2 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Colasay | 18 | 32.9 | 17 | 94 | 1 | 5.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Pucara | 53 | 74.5 | 49 | 92 | 4 | 7.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| San Jose del Alto | 89 | 150.6 | 87 | 98 | 2 | 2.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| Santa Rosa | 33 | 44.3 | 33 | 100 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| **Prov. Jaén** | **5216** | **314.3** | **4436** | **85.05** | **769** | **14.74** | **11** | **0.21** | **1414** | **27.11** | **3** | **0.1** |

Fuente: Sistema NOTISP

## SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE FEBRILES:

La vigilancia contempla a todo febril de cualquier curso de vida, con o sin foco de infección, que acuden a los establecimientos de salud por atención o detectado por búsqueda activa, con el objetivo de detectar, analizar e investigar el incremento inusual relacionado a un brote no detectado por definición de caso.

**En la S.E. 36 - 2025**, se ha notificado 349 febriles en la Prov. Jaén.
En la Provincia de Jaén, la población con mayor número y porcentaje de febriles es la edad de 20 a 59 años, con un 31.7%.

**Tendencia Semanal de la Vigilancia de Febriles**
**Red Integrada de Salud Jaén, hasta S.E. 01 - 36 - 2025**




Fuente: Aplicativo Vig. Febriles-NOTISP

**Casos de Febriles, Porcentaje y TIA por Grupo de Edad**
**Red Integrada de Salud Jaén - S.E. 01 - 36 - 2025**

| Grupo de Edad | N° Casos | % | T.I.A x 1000 hab. |
|---|---|---|---|
| Menor de 01 año | 1568 | 6.9 | 428.8 |
| 1 a 4 años | 4302 | 18.9 | 282.4 |
| 5 a 9 años | 3967 | 17.4 | 212.0 |
| 10 a 19 años | 4201 | 18.5 | 110.8 |
| 20 a 59 años | 7225 | 31.7 | 67.2 |
| Mayo igual a 60 años | 1501 | 6.6 | 79.0 |
| **Total Febriles** | **22764** | **100** | **112.7** |

Fuente: Aplicativo Vig. Febriles-NOTISP

## SITUACIÓN EPIDEMIOLOGICA DE LEPTOSPIROSIS:

La leptospirosis es una enfermedad zoonótica de distribución mundial, endémica en las regiones tropicales con potencial epidémico. Causada por la bacteria Leptospira interrogans que afecta tanto a humanos como animales, ya sean domésticos o silvestres, lo que significa un grave problema de salud pública. Es probable que los perros, los cerdos y las ratas sean las fuentes más comunes de transmisión a los seres humanos. La vigilancia epidemiológica se encuentra establecida a través de la Directiva Sanitaria N° 065 – MINSA/DGE – V.01, "Directiva Sanitaria para la vigilancia epidemiológica de enfermedades zoonóticas, accidentes por animales ponzoñosos y epizootias", que establece los criterios y definiciones de caso para su notificación e investigación.

**En la S.E. 36 - 2025,** notificación negativa de leptospirosis.

**Casos de Leptospirosis**
**Red Integrada de Salud Jaen Años 2021 - 2025 (S.E. 36)**




Fuente: Sistema NOTISP

En la Provincia de Jaén, el total de casos confirmados de Leptospirosis es de 153 casos con una T.I.A. 7.58 y 206 casos probables.

**Casos y Tasa de Incidencia de Leptospirosis**
**Red Integrada de Salud Jaén S.E. 01-36-2025**

| Distritos | Leptospirosis | | |
|---|---|---|---|
| | Notificados en la S.E. 36 | Casos Confirmados S.E. 01-36-2025 | T.I.A. x 10,000 hab. |
| Jaen | | 122 | 11.61 |
| Bellavista | | 23 | 14.95 |
| Chontali | | 1 | 0.98 |
| Huabal | | 2 | 2.21 |
| Pomahuaca | | 2 | 2.09 |
| Pucara | | | 0.00 |
| San Jose Alto | | 3 | 3.83 |
| Total | 0 | 153 | 7.58 |

## VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LEISHMANIASIS:

La Leishmaniasis es una enfermedad de evolución crónica que se adquiere en zonas rurales y es producida por parásitos del género Leishmaniasis. El cuadro clínico varía de acuerdo al tipo del parásito, al medio ambiente y a la respuesta inmune del huésped.
Es importante conocer el comportamiento de los vectores, su distribución, la forma de trasmisión lo cual permitirá establecer nuevas estrategias de intervención.

**En la S.E. 36 - 2025**, se notificó 01 caso de Leishmaniasis procedente de la Localidad de Las Naranjas, Dist. Jaén, Prov. Jaén.




El acumulado a nivel de la Prov. Jaén es 43 casos con una T.I.A. 2.13, siendo el Dist. Chontali con el mayor número de casos con una T.I.A. 11.82.

**Numero de Casos y Tasa de Incidencia de Leishmaniasis**
**Red Integrada de Salud Jaén, S.E. 01 - 36 - 2025**

| Provincia / Distritos | Leishmaniasis | | |
|---|---|---|---|
| | Notificados en la S.E. 36 | Acumulado S.E. 01 - 36 - 2025 | T.I.A. x 10,000 hab. |
| Jaen | 1 | 10 | 0.95 |
| Chontali | | 12 | 11.82 |
| Colasay | | 10 | 9.72 |
| Pomahuaca | | 1 | 1.05 |
| Pucara | | 1 | 1.39 |
| Sallique | | 7 | 9.34 |
| Santa Rosa | | 2 | 1.96 |
| Total | 1 | 43 | 2.13 |

## SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE IRAS:

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) son un conjunto de infecciones que afectan desde oídos, nariz, garganta hasta los pulmones, ocasionados en su mayoría por virus, pero también por bacterias o parásitos; además, constituyen una importante causa de morbimortalidad, fundamentalmente entre los niños menores de 5 años, las personas mayores de 60 años y aquellas que presentan ciertas condiciones que aumentan el riesgo para desarrollar complicaciones que pueden derivar en formas graves; por ejemplo, gestantes, enfermedades inmunosupresoras, entre otras.

**En la S.E. 36 - 2025**, en la Prov. Jaén se notificó 300 IRAS en niños menores de 05 años.

El acumulado de IRAS en menores de 05 años a nivel de la Prov. Jaén es de 9402 una T.I.A. 497.72.
En el canal endémico nos ubicamos es **Zona de Seguridad**.




## SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE LAS NEUMONIAS:

**En la S.E. 36 - 2025**, se notificó 08 neumonías en niños menores de 05 años, de la Prov. Jaén.

En la Prov. Jaén, el acumulado es de 283 casos de Neumonías No Graves y Graves en menores de 5 años, con una T.I.A. 14.98.

Respecto al canal endémico nos ubicamos en **Zona de Epidemia.**



**DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA**
**"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"**

**Numero de Casos y Tasa de Incidencia de Infecciones Respiratorias Agudas**
**Red Integrada de Salud Jaén S.E. 01 - 36 - 2025**

| DISTRITOS | IRAS | | | NEUMONIA | | | SOB/ASMA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S.E. 36 | Acum. S.E. 01 - 36 - 2025 | T.I.A. x 1,000 hab. | S.E. 36 | Acum. S.E. 01 - 36 - 2025 | T.I.A. x 1,000 hab. | S.E. 36 | Acum. S.E. 01 - 36 - 2025 | T.I.A. x 10,000 hab. |
| Jaen | 148 | 5050 | 485.72 | 8 | 274 | 26.35 | 21 | 555 | 53.38 |
| Bellavista | 25 | 790 | 576.22 | 0 | 4 | 2.92 | 0 | 2 | 1.46 |
| Chontali | 7 | 307 | 346.11 | 0 | 1 | 1.13 | 0 | 0 | 0.00 |
| Colasay | 21 | 551 | 624.01 | 0 | 2 | 2.27 | 0 | 0 | 0.00 |
| Huabal | 26 | 715 | 865.62 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Las Pirias | 1 | 102 | 264.25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Pomahuaca | 16 | 423 | 462.80 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 1.09 |
| Pucara | 14 | 426 | 711.19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 5.01 |
| Sallique | 14 | 511 | 647.66 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| San Felipe | 6 | 119 | 331.48 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| San Jose Alto | 11 | 436 | 619.32 | 0 | 1 | 1.42 | 0 | 0 | 0.00 |
| Santa Rosa | 11 | 552 | 712.26 | 0 | 1 | 1.29 | 0 | 0 | 0.00 |
| **Prov. Jaén** | **300** | **9982** | **528.43** | **8** | **283** | **14.98** | **21** | **561** | **29.70** |

Fuente: Sistema NOTISP

## SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE DIARREAS ACUOSAS:

Las enfermedades diarreicas agudas, se caracterizan por un aumento en la frecuencia y una disminución en la consistencia de las heces. Pueden ir acompañados de otros síntomas como dolor abdominal, fiebre, náuseas y malestar. Las enfermedades diarreicas agudas afectan a todos los grupos de edad sin excepción, sin embargo, son la 2da mayor causa de mortalidad en el mundo en los niños menores de 5 años, especialmente en las zonas de pobreza o bajos recursos. Existen 3 tipos de enfermedad diarreica, las acuosas que se caracterizan por ser de presentación explosiva, que puede durar algunas horas o días; las disentéricas o disentería que se caracterizan por la presencia de sangre en las heces y las persistentes que pueden durar más de 14 días.

Las diarreas pueden ser provocadas por microorganismos, como virus, bacterias o parásitos, la mayoría de los cuales se trasmiten por agua y/o alimentos con contaminación.

**En la S.E. 36 - 2025,** se notificaron enfermedades diarreicas acuosas por grupos de edad (<1 año hasta 60+), en la Prov. Jaén 221.

En la Provincia de Jaén el acumulado de Diarreas acuosas es de 8605 caso con una T.I.A. 426.08.

En el canal endémico nos encontramos en **Zona de Epidemia.**




Fuente: Sistema NOTISP

## SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE LAS DIARREAS DISENTERICAS:

**En la S.E. 36 - 2025**, notificación negativa de diarrea disentérica en los distritos de la Prov. Jaén.

En la Prov. Jaén es de 08 casos, con una T.I.A. 0.40.

El Canal endémico los episodios de las diarreas disentéricas se encuentra en **Zona de Éxito.**




Fuente: Sistema NOTISP

**Casos y Tasa de Incidencia de Diarrea Acuosas y Disentéricas**
**Red Integrada de Salud Jaén S.E. 01 - 36 - 2025**

| Provincia/ Distritos | D. Acuosa | | | D. Disenterica | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | S.E. 36 | Acum. S.E. 01-36-2025 | T.I.A. x 10,000 hab. | S.E. 36 | Acum. S.E. 01-36-2025 | T.I.A. x 10,000 hab. |
| Jaén | 119 | 5164 | 491.22 | 0 | 1 | 0.10 |
| Bellavista | 27 | 700 | 455.05 | 0 | 0 | 0.00 |
| Chontali | 5 | 187 | 184.16 | 0 | 1 | 0.98 |
| Colasay | 10 | 352 | 342.18 | 0 | 0 | 0.00 |
| Huabal | 16 | 485 | 534.97 | 0 | 0 | 0.00 |
| Las Pirias | 0 | 182 | 360.04 | 0 | 0 | 0.00 |
| Pomahuaca | 6 | 204 | 213.55 | 0 | 0 | 0.00 |
| Pucara | 4 | 174 | 242.71 | 0 | 2 | 2.79 |
| Sallique | 14 | 432 | 576.62 | 0 | 1 | 1.33 |
| San Felipe | 5 | 118 | 254.20 | 0 | 3 | 6.46 |
| San Jose Alto | 9 | 349 | 445.55 | 0 | 0 | 0.00 |
| Santa Rosa | 6 | 258 | 252.99 | 0 | 0 | 0.00 |
| **Provincia Jaén** | **221** | **8605** | **426.08** | **0** | **8** | **0.40** |

Fuente: Sistema NOTISP

## SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES – SARAMPION /RUBEOLA, PARÁLISIS FLÁCIDA, TOS FERINA.

**¿Qué es Búsqueda Activa?**

Es un procedimiento que trata de identificar en los registros de atención diaria casos sujetos a notificación que por alguna razón o motivo no haya sido captado ni notificado por el sistema de vigilancia epidemiológica.

Tipo de Búsqueda Activa:

**Institucional.-** Se revisa todas las fuentes de información disponibles sobre producción de actividades médicas de un establecimiento de salud.

**Comunitaria.-** Esta actividad se realiza en forma obligatoria como parte del proceso de investigación de toda enfermedad prevenible por vacuna en especial de las enfermedades que se encuentran en vías de erradicación, eliminación y control para ello se hace la visita casa por casa por entrevista a una persona mayor de edad.

Reporte oportuno al 100%.

Se recomienda a los Establecimientos de Salud realizar la búsqueda activa y pasiva de los febriles eruptivos, parálisis flácida y notificación inmediata.

**DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA**
**"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"**

## Parálisis Flácida:

**En la S.E. 36 – 2025,** notificación negativa.

En la Prov. Jaén, se notificó 01 caso probable de Parálisis Flácida, procedente de la Localidad de Rumipite, Distrito La Coipa, Prov. San Ignacio, en un niño de 07 años de edad.

## Tos Ferina:

**En la S.E. 36 – 2025,** notificación negativa.

En la Provincia de Jaén, se tiene un acumulado de 17 casos confirmado de Tos Ferina.

Casos probables y confirmados de Tos Ferina, según inicio de sintomas
Red Integrada de Salud Jaén, SE. 01 - 36 - 2025




Fuente: Sistema NOTISP

El curso de vida con mayor número de casos es de 0 a 11 años, con un 47.1%.

Porcentaje de casos de Tos Ferina, según curso de vida
Red Integrada de Salud Jaén SE. 01 - 35 - 2025




Fuente: Sistema NOTISP

## SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE COVID-19:

El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente el COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo.

**En la S.E. 36 – 2025,** notificación negativa de **COVID-19**, en los distritos de la Prov. Jaén.

En la Provincia de Jaén, tiene un total de 18 casos confirmados con una T.I.A. 0.09.

Casos de COVID-19, según fecha de inicio de síntomas en la
Red Integrada de Salud Jaén, S.E.01 - 36 - 2025




Fuente: Aplicativo COVID-NOTISP

**Casos COVID-19, Tasa de Incidencia, Hospitalizados y Fallecidos**
**Red Integrada de Salud Jaén, S.E. 01-36-2025**

| Provincia / Distritos | Casos de COVID-19 | T.I.A x 1,000 hab. | Hospitalizados | N° Fallecidos |
|---|---|---|---|---|
| Prov. Jaén | 18 | 0.09 | 3 | 1 |
| Jaén | 18 | 0.17 | 3 | 1 |

Fuente: Aplicativo COVID-NOTISP

## SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE MUERTE FETAL/NEONATAL:

Las defunciones fetales y neonatales forman parte del perfil de mortalidad del país; disponer de datos confiables de muerte fetal y neonatal e identificar los denominadores más apropiados para la construcción y monitoreo de indicadores como tasa de mortalidad fetal intrauterina, tasa de mortalidad perinatal y tasa de mortalidad neonatal son necesarios para medir el efecto de los programas de salud materna, neonatal y fetal así como para medir la calidad de la atención antes y durante el trabajo de parto y la atención del neonato.

**En la S.E. 36 - 2025,** notificación negativa de muerte fetal y neonatal.

Muertes Fetales y Neonatales por años
Red Integrada de Salud Jaén 2016 al 2025 (S.E. 01 - 36)




Fuente: Aplicativo MNP-NOTISP

**Muertes Fetales y Neonatales por Distrito**
**Red Integrada de Salud Jaén S.E. 01 - 36 – 2025**

| Distritos | Muerte Fetal | Muerte Neonatal | Total Defunciones |
|---|---|---|---|
| Jaen | 8 | 4 | 12 |
| Bellavista | 0 | 2 | 2 |
| Chontali | 1 | 0 | 1 |
| Colasay | 1 | 2 | 3 |
| Pomahuaca | 1 | 1 | 2 |
| Sallique | 2 | 0 | 2 |
| San Jose Alto | 0 | 1 | 1 |
| Santa Rosa | 1 | 0 | 1 |
| Prov. Jaén | 14 | 10 | 24 |

Fuente: Aplicativo MNP-NOTISP

**DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA**
**"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"**

## MATRIS BABYS:

Es una herramienta de análisis que cruza las variables de edad en el momento de la muerte del feto o neonato (antes/ durante/ después del parto), con el peso al nacer, en un marco de prioridades de intervención y evaluación de las mismas.

| PESO | MUERTE FETAL | | MUERTE NEONATAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ANTES DEL PARTO | DURANTE EL PARTO | DESPUES DEL PARTO | |
| 500 - 1499 grs. | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 1500 - 2499 grs. | 5 | 0 | 4 | 9 |
| > 2500 gr. | 4 | 0 | 4 | 8 |
| TOTAL | 14 | 0 | 10 | 24 |

Fuente: Aplicativo MNP-NOTISP

*Problemas derivados de:*

- *Nutrición, infecciones, alta paridad, o embarazo a temprana edad*
- *Pobre cuidado durante el embarazo*
- *Pobre cuidado y asistencia del parto, emergencias obstétricas*
- *Capacidad institucional de atención del RN, educación en cuidado RN*

| PESO | MUERTE FETAL | | MUERTE NEONATAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | ANTES DEL PARTO | DURANTE EL PARTO | DESPUES DEL PARTO | |
| 500 - 1499 grs. | 29.17 | | | 7 |
| 1500 - 2499 grs. | 81.82 | 0.00 | 33.33 | 9 |
| >2500 gr. | | | | 8 |
| TOTAL | 14 | 0 | 10 | 24 |

Fuente: Aplicativo MNP-NOTISP

**Hasta la S.E. 36-2025,** el 29.17% de la mortalidad perinatal neonatal corresponde a productos con pesos inferiores a 1500 grs. y que están relacionados a problemas en la salud materna (nutrición, infecciones, alta paridad, embarazos a temprana edad, etc.).

- El 33.33% de las notificaciones corresponden a productos con bajo peso y peso normal, lo que estaría relacionado a los procesos de atención del RN, capacidad institucional y educación para el cuidado del RN en el hogar.
- Es de mucha importancia registrar el dato de momento de parto, de manera correcta, así como el peso.

| PESO | MUERTE NEONATAL | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | <24 Horas | 1-7 Dias | 8-28 Dias | |
| 500 - 1499 grs. | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 1500 - 2499 grs. | 1 | 3 | 0 | 4 |
| >2500 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| TOTAL | 1 | 7 | 2 | 10 |
| PORCENTAJE | 10.0 | 70.0 | 20.0 | 100 |

Fuente: Aplicativo MNP-NOTISP

**Hasta la S.E. 36 -2025**, la mayor proporción de defunciones neonatales se registra en RN con 1 a 7 días de vida (70%).

De los RN que fallecieron a partir del día 8, el 20% registró peso normal o superior a 2500 grs.

Es necesario colocar correctamente la Fecha/Hora de nacimiento y de muerte, caso contrario no se puede determinar el tiempo de sobrevida.

## SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE MUERTE MATERNA:

La salud materna es uno de los temas de salud pública de gran importancia y prioritario, siendo considerada un indicador de inequidad de género, inequidad en el acceso a los servicios de salud, pobreza, injusticia y desigualdad social. En la tabla siguiente se muestra las muertes maternas según tipo y procedencia por distrito desde el año 2016 al 2025.

**En la S.E. 36 - 2025,** notificación negativa de M. Materna.

A nivel de la RIS Jaén, se tiene 03 M. Maternas, 01 procedente de la Localidad El Laurel de Chingama, jurisdicción de Ambato Tambora, Distrito Bellavista, 01 Localidad Arenal, Dist. Jaén, Prov. Jaén y 01 M. Materna, procedente de la Localidad de Nvo. Paraiso, Dist. Cajaruro, Prov. Bagua.

**Notificación de Muertes Maternas por Distrito, Años y Procedencia**
**Red Integrada de Salud Jaén 2016 - 2025 (S.E. 01-36)**

| Distritos | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | M.M. Directa | M.M. Indirecta | M.M. Directa | M.M. Indirecta | M.M. Directa | M.M. Indirecta | M.M. Directa | M.M. Indirecta | M.M. Incidental | M.M. Directa | M.M. Indirecta |
| Jaén | | | | | 2 | | | 1 | | | 1 |
| Bellavista | | | | | | | | | | 1 | |
| Colasay | | | | | | | | | | | |
| Pomahuaca | | | | | | | | | | | |
| Pucara | | | 1 | | | | | | | | |
| Chontali | | | | | | | | | | | |
| Sallique | | | | | | | | | | | |
| San Felipe | 1 | | | | | | | | | | |
| San Jose del Alto | | | | | | | | | | | |
| Santa Rosa | | | | | | | | | | | |
| **Prov. Jaén** | **3** | **0** | **1** | **0** | **2** | **0** | **0** | **1** | **0** | **1** | **1** |

## SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE VIOLENCIA FAMILIAR:

El termino Violencia familiar alude a todas las formas de abuso que tienen lugar en las relaciones entre los miembros de una familia. Se denomina relación de abuso a aquella forma de interacción que, enmarcada en un contexto de desequilibrio de poder, incluye conductas de una de las partes que, por acción o por omisión, ocasionan daño físico y/o psicológico a otro miembro de la relación.

**Hasta la S.E. 36 - 2025,** podemos observar casos de violencia predomina en mujeres de edad entre 30 y 59 años (32.6%), donde el 29.5% cuenta con secundaria completa, en los distritos de la Prov. Jaén.

**Características de los agredidos por violencia familiar**
**Red Integrada de Salud Jaén, S.E. 01 – 36 - 2025**

| Características | Nº Casos | % |
|---|---|---|
| **Sexo** | | |
| Femenino | 201 | 88.5 |
| Masculino | 26 | 11.5 |
| **Curso de vida** | | |
| Niño (0-11) | 27 | 11.9 |
| Adolescente (12-17) | 50 | 22.0 |
| Joven (18-29) | 68 | 30.0 |
| Adulto (30-59) | 74 | 32.6 |
| Adulto mayor (60 a más) | 8 | 3.5 |
| **Grado de instrucción** | | |
| Secundaria completa | 67 | 29.5 |
| Secundaria incompleta | 54 | 23.8 |
| Primaria incompleta | 38 | 16.7 |
| Primaria completa | 30 | 13.2 |
| Superior completa | 17 | 7.5 |
| Superior incompleta | 12 | 5.3 |
| Iletrada | 9 | 4.0 |

El tipo de violencia ejercido en ellas en su mayoría es la violencia psicológica (56.4%) y física (23.5%), no exisitiendo motivo para sufrir este maltrato.

**Características de la agresión por violencia familiar**
**Red Integrada de Salud Jaén, S.E. 01-36-2025**

| Características | Nº Casos | % |
|---|---|---|
| **Tipo de violencia** | | |
| Psicológica | 180 | 56.4 |
| Física | 75 | 23.5 |
| Sexual | 58 | 18.2 |
| Abandono | 6 | 1.9 |
| **Motivo expresado** | | |
| Sin motivos | 72 | 41.6 |
| Celos | 52 | 30.1 |
| Otros | 22 | 12.7 |
| Economicos | 24 | 13.9 |
| Laborales | 3 | 1.7 |

Fuente: Sistema Violencia Familiar – NOTISP

## SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE ACCIDENTES TRANSITO:

**A la S.E. 36-2025**, se ha notificado 404 lesionados por accidentes de tránsito, del cual el 68.6% de lesionados corresponden al sexo masculino y el 31.4% al sexo femenino.

Siendo el curso de vida adulto, el más afectado por accidentes de tránsito.

**Accidentes de Tránsito, por curso de vida**
**Red Integrada de Salud Jaén, S.E. 01 – 36 – 2025**




**Fuente: Sistema Accidentes Transito – NOTISP**

Los Distritos donde se tiene la mayor ocurrencia de lesionados por accidentes de tránsito es el Distrito de Jaén con 80.9% (327), seguido de Bellavista con 7.67 % (31).

**Accidentes de Tránsito, por Distrito de ocurrencia**
**Red Integrada de Salud Jaén, S.E. 01 – 36 – 2025**




Fuente: Sistema Accidentes Transito – NOTISP

## SITUACION EPIDEMIOLOGICA DE ITS – VIH SIDA:

Desde el inicio de la epidemia de VIH en nuestro país, han transcurrido casi 3 décadas en las cuales se ha logrado avanzar en términos de prevención y atención de la población más afectada y vulnerable, sin embargo, esta continúa siendo un importante problema de salud pública, con una epidemiología compleja que plantea retos para un mayor conocimiento de su dinámica y para el diseño de intervenciones que permitan disminuir las brechas aún existentes en prevención y control de esta infección.

Así mismo, las infecciones de transmisión sexual (ITS) constituyen un importante cofactor que incrementa la probabilidad de transmisión del VIH, y cuyo abordaje en las políticas de salud es relevante.

## SIFILIS:

**En la Provincia de Jaén en la S.E. 36 - 2025,** no se han notificado casos de sífilis y gonorrea y en lo que va del año 2025, en el sistema de vigilancia epidemiológica ITS se encuentran notificados un total de 19 casos de sífilis, los mismos que se encuentra siendo monitoreados por los establecimientos de salud notificantes.

**Casos confirmados de Sífilis, por semanas epidemiológicas**
**Red Integrada de Salud Jaén SE. 01-36-2025**




**Fuente: Aplicativo VIH-SIDA/ITS**

## VIH – SIDA:

**En la Provincia de Jaén,** en la **S.E. 36**, la notificación es negativa a VIH.

En lo que va el año 2025, en el sistema de vigilancia epidemiológica de VIH– SIDA, han notificado un total de 45 casos confirmados, de los cuales 03 casos diagnosticado en estadio SIDA.

**Casos de VIH-SIDA, según semanas epidemiológicas**
**Red Integrada de Salud Jaén SE. 01 – 36 - 2025**



**DIRECCION DE EPIDEMIOLOGÍA**
**"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"**

# MAPA EPIDEMIOLOGICO DE LAS ENFERMEDADES ACUMULADAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
# RED INTEGRADA DE SALUD JAEN S.E. 36 – 2025

**S. JOSE ALTO**
Dengue Sin S. Alarma: 87 casos
Dengue Con S. Alarma: 02 casos
Leptospirosis: 04 casos
Enf. Carrión: 01 caso
Intox. Plaguicidas: 03 casos
Sífilis: 01 caso

**CHONTALI**
Dengue Sin S. Alarma: 02 casos
Leishmaniasis: 12 casos
Leptospirosis: 01 caso
M. Fetal: 01 defunción

**SALLIQUE**
Leishmaniasis: 07 casos
Ofidismo: 01 caso
Tos Ferina: 01 caso
M. Fetal: 02 defunciones

**SAN FELIPE**

**POMAHUACA**
Leptospirosis: 02 casos
Tos Ferina: 01 casos
Leishmaniasis: 01 caso
Sífilis: 01 caso
Ofidismo: 01 caso
Intox. Plaguicidas: 02 casos

**PUCARA**
Dengue Sin S. Alarma: 49 casos
Dengue Con S. Alarma: 04 casos
Leishmaniasis: 01 caso
Parálisis Flácida: 01 caso
Intox. Plaguicidas: 01 caso



**BELLAVISTA**
Dengue Sin S. Alarma: 157 casos
Dengue con S/Alarma: 37 casos
Hepatitis: 02 casos
Sífilis: 02 casos
Leptospirosis: 39 casos
Intox. Plaguicidas: 04 casos
M. Materna: 01 defunción
M. Neonatal: 01 defunción

**SANTA ROSA**
Dengue Sin S. Alarma: 33 casos
Leishmaniasis: 02 casos
Hepatitis: 02 casos
Varicela S/Compl.: 01 caso
Sífilis: 01 caso
M. Fetal: 01 defunción

**HUABAL**
Leptospirosis: 03 casos
Intox. Plaguicidas: 01 caso

**LAS PIRIAS**
Sífilis: 01 caso

**JAEN**
Dengue Sin S. Alarma: 4091 casos
Dengue con S/Alarma: 725 casos
Dengue Grave: 11 casos
Oropuche: 02 casos
Hepatitis: 06 casos
Leptospirosis: 308 casos
Intox. Plaguicidas: 03 casos
Sífilis: 15 casos
Tos Ferina: 15 casos
Leishmaniasis: 10 casos
Influenza: 01 caso
Covid-19: 18 casos
Loxocelismo: 01 caso
M. Materna: 01 defunción
M. Fetal: 08 defunciones
M. Neonatal: 05 defunciones

**COLASAY**
Dengue Sin S. Alarma: 17 casos
Dengue Con S. Alarma: 01 casos
Leptospirosis: 01 caso
Leishmaniasis: 10 casos
Intox. Plaguicidas: 01 caso
Ofidismo: 01 caso
M. Fetal: 01 defunción
M. Neonatal: 02 defunciones